

## CÁNCER DE TIROIDES

Varón, 16 años

MC: Tumoración de cuello

E.A.: Comienza hace 4 meses con tumoración anterior de cuello infrahioidea lateralizada a izquierda que nota asciende con la deglución. Tuvo un crecimiento progresivo hasta el tamaño actual de unos 4 cm. Es indolora y nunca notó calor ni rubor local. Niega disnea, alteraciones de la deglución y disfonía. En eutiroidismo.

Tránsito digestivo y urinario normales.

AP: s/p. AF: s/p

Examen físico

Vigil bien orientado en tiempo y espacio.

P y M: normocoloreadas.

Cuello: Tumoración anterior e infrahioidea de cuello que se moviliza con la deglución pareciendo ser solidaria con el lóbulo izq. de la glándula tiroides, y se atenúa con la contracción de de músculos infrahioideos. Está cubierta por piel sana. A la palpación es redondeada de unos 4 cm diámetro, dura, indolora. El craqueo laríngeo está conservado. No se perciben otras tumoraciones en la glándula tiroides.

LG: Se palpa tumoración en región carótidea media izquierda de 1,5 cm firme móvil indolora.

Examen pleuropulmonar, cardiovascular y abdominal normal.

### Preguntas:

1. ¿Cuál es su diagnóstico y en qué elementos clínicos se basa?
2. ¿Cómo define esta patología?
3. ¿Cuál es la epidemiología?
4. Clasifique anatómicamente esta patología.
5. Describa los aspectos etiopatogénicos de esta enfermedad.
6. ¿Cuáles son los elementos pronósticos a tener en cuenta?