

## HIDATIDOSIS HEPÁTICA Y SUS COMPLICACIONES

Hombre de 57 años, procedente de Treinta y Tres. Trabajador rural.

MC: enviado por dolor y tumoración abdominal.

EA: comienza hace 1 mes aproximadamente, con dolor epigástrico, gravativo, esporádico, sin relación con las ingestas. Niega alteraciones del tránsito digestivo bajo. No alteraciones del tránsito urinario. No elementos clínicos de repercusión general.

Niega síndrome toxiinfeccioso.

AP: fumador intenso de larga data, enolista moderado.

Examen físico: lúcido, eupneico, apirético. Buen estado general.

PyM: sin alteraciones.

PP: sibilancias bilaterales, moviliza secreciones.

CV: s/p.

Abdomen: plano, blando, depresible. Borde inferior hepático a 3 traveses de dedo del reborde costal, límite superior en 5º espacio intercostal. Ocupación epigástrica por tumoración, levemente dolorosa, que desciende desde el inicio de la inspiración, de límites mal definidos, de unos 8 cm. de diámetro, de forma redondeada. Es difícil de especificar más datos por el tono de la musculatura parietal.

Resto del examen sin alteraciones.

ECO ABD: Discreta hepatomegalia. A nivel de los segmentos III-IV, formación redondeada, quística, de 10 cms de diámetro con contenido inhomogéneo, con calcificaciones. Toma contacto con la rama izquierda de la vena porta. Vía biliar intra y extra hepática no dilatadas. Vesícula biliar de paredes finas, sin litiasis en su interior. Resto sin alteraciones.

### Preguntas:

- 1) Realice los planteos diagnósticos.
- 2) Enumere los estudios paraclínicos a solicitar.
- 3) Indique las opciones terapéuticas.
- 4) ¿Cuáles son las complicaciones de la Equinocosis Hidatídica Hepática?