

PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA

Mujer, 30 años, Montevideo.

MC: nódulo de mama derecha

EA: hace 8 meses nota tumoración de mama, situada en el cuadrante supero interno derecho, de aprox. 4 cm de diámetro, redondeada, no consultado por temor que se le diagnosticara cáncer. En los últimos meses, crecimiento de dicha tumoración en relación a su ciclo menstrual, no secreción por el pezón, no alteraciones cutáneas, no retracción del pezón, no tumoraciones de axila.

AP: fumadora de 1 caja día, no traumatismo mamario

AGO: menarca 14 años, ciclos regulares, 1 gesta, 1 parto vaginal, lactancia durante 6 meses.

AF: madre fallecida por cáncer de mama

Examen Físico: buen estado general, obesa, normocolorodeada

Cuello. No adenopatías, PP: moviliza secreciones a la auscultación

Mamas: mama voluminosas, péndulas. Inspección dinámica: se observa tumoración de cuadrante súper interno mama derecha, no capitonaje, no piel de naranja. Palpación: tumoración de 5 cm de diámetro aprox., redondeada, superficie regular, consistencia firme elástica, móvil con respecto a la glándula mamaria, indolora. Escapa a la palpación manual. Axila s/p. Mama y axila izq. s/p.

Mamografía, lesión BIRADS 3 mama derecha.

Ecografía mamaria. Nódulo sólido de 5,2 cm de diámetro transversal en cuadrante súper interno mama derecha, regular, bordes netos, estructura homogénea.

Preguntas:

1. ¿Cuáles son los aspectos clínicos relevantes para el diagnóstico clínico?
2. Discuta aspectos etiopatogénicos y anatomopatológicos de esta entidad.
3. ¿Qué valor tiene la mamografía en dicha patología, ¿solicitaría otro estudio?
4. Discuta tratamiento, e indicación de cirugía en esta paciente .

