

TUMORES DE PARTES BLANDAS

Hombre. 26 años.

MC: tumoración en región poplítea izquierda. de crecimiento progresivo de aproximadamente 2 meses de evolución.

Enfermedad Actual:

Tumoración de partes blandas en región poplítea izquierda que aparece hace 2 meses sin traumatismo previo y tiene un crecimiento progresivo. Lo relaciona con esfuerzo deportivo a partir del cuál las molestias son continuas y asociadas a la tumefacción poplítea. Refiere molestias a la flexión máxima de la rodilla. No fiebre, rubor ni calor local. No astenia, adinamia ni adelgazamiento.

Tránsitos digestivo y urinario normales.

Sin antecedentes personales o familiares a destacar

Examen físico:

Vigil. Bien orientado en tiempo y espacio.

Piel y Mucosas normocoloreadas

Pleuropulmonar y cardiovascular dentro de parámetros normales

Abdomen blando depresible indoloro

Tumoración de partes blandas localizada en la región del hueco poplíteo izquierdo, levemente ovoidea, de 7 cm de diámetro mayor, superficie lisa, consistencia firme elástica, adherida a planos profundos y que se delimita por palpación en su parte distal pero no se encuentra un límite claro en la proximal. Esta delimitación se hace menos clara al contraer el paciente los músculos de las logias posteriores de pierna y muslo izquierdos. Es indolora y no pulsa ni expande.

No otras tumoraciones

No circulación colateral. No afectación vascular distal (pulsos distales presentes e isócronos.

No afectación neurológica.

Preguntas

- 1) Indique su sospecha diagnóstica y posibles diagnósticos diferenciales
- 2) ¿En qué estructura anatómica cree Ud. que se origina la tumoración y por qué?
- 3) ¿Qué recursos diagnósticos de imagen le pueden ser de ayuda diagnóstica?
- 4) ¿Qué recursos diagnósticos anatomopatológico conoce?
- 5) ¿Qué modalidad terapéutica propondría?