

INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA DE MMII

63 años sexo femenino

MC: Lesión ulcerada de tobillo derecho

EA: Comienza hace un mes luego de golpe leve, con lesión al inicio pequeña en pierna derecha por encima del tobillo en su cara interna. La misma aumenta de tamaño provocando dolor.

Nota exudación local.

AEA: Várices en ambos miembros inferiores desde la juventud. Desde hace 10 años presenta a derecha cambio de coloración de la piel de la pierna en su sector inferior que adopta un color más oscuro en forma progresiva. Edema de ambos miembros inferiores al permanecer mucho tiempo de pie que retrocede parcialmente durante la noche.

Trabaja en tienda desde los 20 años atendiendo público. No realiza ejercicio físico. Nunca consultó por sus várices.

Ex. Físico: Lúcida, eupneica, obesa, P y M normocoloreadas. RR 88 cpm.

A nivel de miembros inferiores presenta várices gruesas en ambos muslos en cara interna, así como en cara interna y posterior de ambas piernas, serpiginosas. A nivel de tercio inferior de pierna derecha presenta área cutánea circunferencial completa con coloración amarronada, en áreas lisa y brillante. En el sector inmediato superior al maléolo interno se aprecia lesión ulcerada de unos 5 cm de diámetro, de bordes regulares, con fondo recubierto de fibrina. Motilidad del tobillo conservada. A izquierda área cutánea de características similares que afecta sector interno supramaleolar sin ulceraciones. Pulsos presentes normales bilateralmente.

Preguntas:

1. Realice el diagnóstico positivo actual de la enfermedad, justifique.
2. Realice el diagnóstico del sistema afectado
3. Realice el diagnóstico etiopatogénico de la enfermedad
4. Realice el diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad
5. ¿Qué estudios paraclínicos realizaría y por qué?
6. ¿Qué complicaciones evolutivas pueden surgir?
7. ¿Qué tratamiento plantea en ésta paciente?
8. ¿Qué medidas profilácticas pueden plantearse en ésta situación?